

# VACUNAS COMERCIALIZADAS EN ESPAÑA

MARCA COMERCIAL	C.N.	PRESENTACIÓN	EDAD DE USO AUTORIZADA	ESTABILIDAD a temperat. > 8°C	OBSERVACIONES
<b>Difteria - Tétanos (Td)</b>					
Diftavax® (INSNS)	656756	T: 20 UI - d: 2 UI 1 jeringa precargada 0,5 ml	A partir de 7 años	Meses (8° a 25°C) 6 semanas (35°-37°C)	No congelar. Nunca inyectar por vía intravenosa.
<b>Difteria - Tétanos - Tosferina (DTPa o Tdpa)</b>					
Boostrix® (Tdpa) (EXO)	731349	d: 2 UI - T: 20 UI - pa: 18,5 µg 1 jeringa precargada 0,5 ml	A partir de 4 años	8 horas hasta 21°C	No congelar
Triaxis® (Tdpa) (DIHSC)	711632	d: 2 UI - T: 20 UI - pa: 15,5 µg 1 jeringa precargada 0,5 ml		72 horas (8° a 25°C)	
<b>Haemophilus influenzae B (Hib)</b>					
Hiberix® (DH) (CPD) (V)	664730	10 µg 1 vial polvo + jeringa disolvente 0,5 ml	A partir de 2 meses	7 días (<37°C)	No congelar
<b>Triple vírica (Sarampión - Rubéola - Parotiditis)</b>					
Priorix® (*)	708164	1 vial + 1 jeringa disolv. 0,5 ml	A partir de 9 meses	72 horas (8° a 25°C)	No congelar
	708172	10 viales+10 jeringas 0,5 ml			
M-M-Rvaxpro® (DIHSC) (*)	673037	1 vial + 1 jeringa disolv. 0,5 ml	A partir de 12 meses.	Consultar laboratorio	
	758481	10 viales+10 jeringas 0,5 ml	Casos especiales: >9 meses		
<b>Varicela - Zóster</b>					
Varilrix® (DIHSC) (*)	668822	1 vial polvo + 1 jeringa precargada disolvente 0,5 ml Contiene sorbitol	A partir de 12 meses. En circunstancias especiales: > 9 meses	72 horas (8° a 25°C)	La vacuna se puede congelar. El disolvente no.
Varivax® (DIHSC) (*)	651402	1 vial polvo + 1 jeringa precargada disolvente 0,5 ml		30 minutos (20-25°C)	Son intercambiables
Shingrix® (DIHSC)	729304	1 vial polvo + 1 vial suspensión	A partir de 50 años Casos especiales: > 18 años	Consultar laboratorio	No congelar No intercambiable
<b>Hepatitis A</b>					
Avaxim® (CPD) (V)	731326	1 jeringa precargada 0,5 ml	A partir de 16 años	48 horas (8° a 25°C)	No congelar
Havrix® (CPD) (V) (*)	700676	720 U Pediátrico 1 jer. precarg.	De 1 a 18 años	72 horas (8° a 25°C)	
	700677	1440 U Adultos 1 jer. precarg.	A partir de 19 años		
Vaqta® (DIHSC) (*)	652442	25 U Pediátrico 1 jer. precarg.	De 1 a 17 años	3 meses (8° a 28°C)	Son intercambiables
	652443	50 U Adultos 1 jer. precarg.	A partir de 18 años		
<b>Hepatitis B</b>					
Engerix B Junior® (CPD)(V)	877514	10 µg Pediátrico 1 jer. precarg.	De 0 a 15 años	7 días (8° a 25°C)	No congelar
Engerix B® (CPD) (V)	686709	20 µg Adultos 1 jer. precarg.	A partir de 16 años	72 horas (<37°C)	
	652093	5 µg Pediátrico 1 jer. precarg.	De 0 a 15 años	72 horas (8° a 25°C)	
HBVaxpro® (DIHSC)	652094	10 µg Adultos 1 jer. precarg.	A partir de 16 años		Son intercambiables
	906826	40 µg Adultos 1 vial	Adultos Dializados		
Fendrix®	650862	20 µg 1 jeringa precargada	> 15 años con Ins. Renal	72 horas (<37°C)	
<b>Hepatitis A y B</b>					
Twinrix® (*)	803767	10µg/360U Pediátrico 1 jer prec	De 1 a 15 años	7 días (8° a 25°C)	No congelar
	857946	20µg/720U Adultos 1 jer. prec.	A partir de 16 años		
<b>VPH (Virus del Papiloma Humano)</b>					
Cervarix® (DIHSC)	659685	1 jeringa precargada 0,5 ml	A partir de 9 años	72 horas (8° a 25°C) 24 horas (25° a 37°C)	No congelar Cervarix y Gardasil 9 no son intercambiables <b>Gardasil 9 abacus: (IP) importación paralela</b>
Gardasil 9® (DIHSC)	707342				
Gardasil 9 abacus® (DIHSC)	758339			96 horas (8° a 40°C) 72 horas (0° a 2°C)	
<b>Antineumocócica</b>					
Apexxnar® (DIHSC)	732860	1 jeringa precargada 0,5 ml	A partir de 18 años	96 horas (8° a 25°C)	No congelar
Pneumovax 23® (DIHSC)	706818		A partir de 2 años	Consultar laboratorio	
Prevenar 13® (DIHSC)	654443		A partir de 6 semanas	96 horas (8° a 25°C)	
Vaxneuvance® (DIHSC)	737665		A partir de 6 semanas	Consultar laboratorio	
<b>Rotavirus</b>					
Rotarix®	661543	Tubo precargado	suspensión ORAL 1,5 ml	De 6 a 24 semanas	72 horas (8° a 25°C) 24 horas (25° a 37°C)
Rotarix Abacus® (IP)	731045	Tubo precargado			
Rotarix Ecofar® (IP)	759122	Tubo precargado			
Rotarix ElamPharma® (IP)	732458	Tubo precargado			
Rotarix MelyPharma® (IP)	731553	Tubo precargado			
Rotateq®	654712	Tubo exprimible solución ORAL 2 ml	De 6 a 32 semanas	36 horas (8° a 25°C)	Solo administración ORAL  Rotarix y Rotateq NO son intercambiables
Rotateq Abacus® (IP)	731044				
Rotateq Ecofar® (IP)	759162				
Rotateq ElamPharma® (IP)	709886				
Rotateq MelyPharma® (IP)	729226				

MARCA COMERCIAL	C.N.	PRESENTACIÓN	EDAD DE USO AUTORIZADA	ESTABILIDAD a temperatura > 8°C	OBSERVACIONES	
<b>McC - Meningitis C (Conjugada)</b>						
Menjugate® (DH) (CPD) (V)	706479	10 µg 1 jeringa precarg. 0,6 ml	A partir de 2 meses	5 días (8° a 25°C)	No congelar	
Neisvac C® (DH) (EXO)	933788	10 µg 1 jeringa precarg. 0,5 ml		9 meses (8° a 25°C)		
<b>Meningitis A + C + W + Y</b>						
Menveo®	(DIHSC) 677725	1 vial + 1 vial disolvente 0.6 ml	A partir de 2 años	5 días (8° a 25°C)	No congelar	
	732333	10 viales + 10 disolvente 0.6 ml				
Menquadfi®	(DIHSC) 729825	1 vial sol. inyectable 0.5 ml	A partir de 12 meses	72 horas (8° a 25°C)		
	732101	5 viales sol. inyectable 0.5 ml				
Nimenrix®	690375	1 vial + 1 jer. disolvente 0.5 ml	A partir de 6 semanas	30 días (<39°C)		
<b>Meningitis B</b>						
Bexsero® (DIHSC)	701257	1 jeringa precargada 0,5 ml	A partir de 2 meses	48 horas (8° a 25°C)	No congelar	
Trumenba® (DIHSC)	716598	1 jeringa precargada 0,5 ml	A partir de 10 años	Consultar al laboratorio		
<b>Tifoidea</b>						
Vivotif® (Oral) (INSNS)	724008	3 cápsulas	A partir de 5 años	24 horas (8° a 25°C)	No congelar	
Typhim VI®	652468	1 jeringa precargada 0,5 ml	A partir de 2 años	Consultar al laboratorio		
<b>Virus Respiratorio Sincitial (VRS)</b> <span style="color: red;">➔ Inmunización pasiva en lactantes ≤ 6 meses</span>						
Abrysvo® (DIHSC)	762989	1 vial polvo+1 jer. precar. 0,5 ml	Embarazo y > 60 años	Consultar al laboratorio	No congelar	
<b>OTRAS VACUNAS</b>						
Antirrábica Rabisur® (H) (*)	711054	1 vial polvo+1 jeringa disolvente 1 Dosis 2,5 UI	Niños y adultos (todas las edades)	48 horas (8° a 30°C)	No congelar	
Fiebre amarilla Stamaril® (H)	654297	1 vial polvo+1 jeringa disolvente 0,5 ml	Adultos y niños > 9 meses Casos especiales: > 6 meses	Consultar al laboratorio		
Cólera Dukoral® (Oral) (INSNS) ▶	700697	1 vial 3 ml suspensión oral + 1 sobre granulado efervescente	De 2 a 6 años: 3 dosis A partir de 6 años: 2 dosis	14 días (8° a 25°C)		
Cólera Vaxchora® (Oral) (INSNS)	728425	(Oral): 1 sobre p. activo + 1 sobre tampón	A partir de 2 años: 1 dosis	12 horas (8° a 25°C)		
Dengue Qdenga®	758837	1 vial polvo+1 jeringa disolvente 0,5 ml	A partir de 4 años: 2 dosis	Consultar al laboratorio		
Encefalitis japonesa Ixiaro® ▶	663059	1 jeringa precargada 0,5 ml	A partir de 2 meses	Consultar al laboratorio		
Tuberculosis Vacuna BCG® (INSNS) ▶	758854	10 dosis 1 vial + 1 vial disolvente	Niños y adultos (todas las edades)	Consultar al laboratorio		
DIHSC: Dispensación Hospitalaria sin cupón precinto - DH: Diagnóstico Hospitalario - CPD: Cupón Precinto Diferenciado - H: Uso Hospitalario - INSNS: financiable EXO: excluido de la oferta de la S.S. - V: Visado de inspección - (*): Contiene Neomicina - ▶ Problema de suministro - ▶ Por medicamento extranjero						

## VACUNAS COMBINADAS

MARCA COMERCIAL	C.N.	COMPOSICIÓN	EDAD DE USO AUTORIZADA	ESTABILIDAD a Temp. >8°C	OBSERVACIONES
Boostrix polio®	650433	Tdpa, VPI	A partir de 3 años	8 horas (8° a 21°C)	No congelar (a) sin aguja (b) con aguja *10 viales + 10 jeringas **10 jeringas precarga.
Hexyon® (*)	731499(a) - 698078(b)	DTPa, HB, Hib, VPI	De 6 semanas a 2 años	Consultar al laboratorio	
Infanrix Hexa® (*)	657445 - 657452*	DTPa, HB, Hib, VPI	De 6 semanas a 3 años	72 horas (8° a 25°C)	
Infanrix IPV®	730055	DTPa, VPI	De 16 meses a 13 años	72 horas (8° a 25°C)	
Proquad® (*)	654276	Triple Vírica + Varicela	A partir de 12 meses(1)	30 minutos (20° a 25°C)	
Tetraxim® (INSS) (*)	729101	DTPa, VPI	A partir de 2 meses	Consultar al laboratorio	
Vaxelis® (DIHSC)	714004 - 721440**	DTPa, HB, Hib, VPI	A partir de 6 semanas	150 horas (8° a 25°C)	
EXO: excluido de la oferta de la S.S. (*) Contiene Neomicina VPI: Vacuna Polio Inyectable (1) En circunstancias especiales: > 9 meses					

## VACUNAS ANTIGRIPALES – Campaña 2023 - 2024

TIPO	MARCA COMERCIAL	CÓDIGO NACIONAL	ANTIBIÓTICO	INDICACIONES
Inactivadas Virus Fraccionados	Efluelda®	728468(a) - 728470(a) *	NO	Recomendada a > 60 años
	Fluarix tetra®	708994(b) - 708995(a) **	Gentamicina	Adultos y niños > 6 meses
	Vaxigrip tetra®	713497(b) - 716024(a)	Neomicina	Adultos y niños > 6 meses Embarazadas(c)
Inactivadas Antígenos de superficie	Flucelvax tetra®	728216(a) - 724966(a) **	NO	Adultos y niños > 2 años
	Influvac tetra®	728232(a) - 728233(a)** - 719762(b) - 719763(b)**	Gentamicina	Adultos y niños > 6 meses
Inactivadas Antígenos de superficie (subunidades adyuvadas)	Fluad tetra®	729302(a) **	Kanamicina / Neomicina	Recomendada a > 65 años
Virus atenuados	Fluenz Tetra® (Nasal)	705696	Gentamicina	Niños > 2 años y < 18 años
<ul style="list-style-type: none"> <li>Todas las vacunas de la Campaña 2023-2024 son tetravalentes. Todas excluidas de la oferta de la SS (EXO)</li> <li>Todas las vacunas, excepto Flucelvax Tetra® (producida a partir de cultivos celulares) están contraindicadas en personas alérgicas a las proteínas del huevo, por obtenerse de cultivos en huevos de pollo.</li> <li>Todas las vacunas, excepto Flucelvax Tetra® y Fluenz Tetra®, contienen formaldehído.</li> <li>Vigilar las caducidades. • No dispensar vacunas de la campaña anterior.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Jeringa precargada sin aguja</li> <li>(b) Jeringa precargada + aguja</li> <li>(c) Inmunización pasiva en lactantes ≤ 6 meses</li> <li>* Presentación de 5 jeringas precargadas</li> <li>** Presentaciones de 10 jeringas precargadas</li> </ul>	

**Las vacunas se conservan siempre en nevera, entre 2-8°C, en su envase original. NO romper la cadena de frío**

- Comité Asesor de Vacunas Sociedad Española de Pediatría ([vacunasaep.org](http://vacunasaep.org))
- Asociación Española de Vacunología ([www.vacunasaep.org](http://www.vacunasaep.org))
- Termofarma (<https://www.farmaceticosdesevilla.es/farmaceticos/utilidades/>)
- SEFH (<https://www.sefh.es/bibliotecavirtual/termolabil2017/ConservacionTermolabiles2017.pdf>)
- [www.andavac.es/](http://www.andavac.es/)
- Botplus

**Las vacunas requieren receta médica para su dispensación**